



Tupp under uppvaktning av hönan

Frontuppvisningen är särskilt spektakulär. Tuppen vetter mot hönan från ca 1 m avstånd, kröker sig ner något, rasslar med sina fjädrar, sträcker ut sina vingar och klappar vingarna mot marken. Han nickar på huvudet och upprepar detta med ökande hastighet. Hans horn blir uppblåsta, hans haklapp fälls ut, och fågeln rycker och rasslar med sina fjädrar. Han gör också ett väsende ljud. När haklappen har blivit helt utfälld, kommer tuppen att stoppa sin dans, flytta sig närmare hönan och fortsätta visa henne sin haklapp. Han slappnar sedan och hornen och haklappen drages ihop. Häckningen sker normalt från maj till juni, vissa fåglar på högre höjder börjar inte häcka förrän i juli, på grund av senare vår på högre höjder. Redet är gjord av pinnar och kvistar och är byggd över markytan, i träd och buskar på en höjd av 6 m eller mer. Det är väl dolt från insyn. I naturen är en typisk äggkull två till tre ägg. I fångenskap kan hönan lägga fyra till sex ägg och ibland så många som åtta ägg. De ljus rödbruna äggen har små mörkare



Satyrhöna

Tuppen av denna art har den mörkaste, djupaste röda underdelen av alla tragopaner. Huvudet är svart. I övrigt är dräkten främst mörk rödbrun till svart, prickad med små, svartkantade vita runda prickar. Som på andra tragopaner, har tuppen en lysande utsmyckning med en vid spel uppblåsbar haklapp. Den skinnliknande haklappen är av uppblåsbar hud, med starkt lysande blå färger, från ljusblått till mörkblått som är dekorerad med en serie starkt röda fläckar på haklappens sidor. Två ljusblå uppblåsta horn över öronen hör också till uppvisningen vid tuppens spel. Benen är rosa till gråvita och näbben är svart. Som kontrast till tuppens färgglada fjäderdräkt är hönan skyddsfärgad i mörkt brunt upptill, ljusare undertill, med ljusbruna trekantiga fläckar omgivna med svart kant.



Satyrtragopan ägg

Äggen mäter ca 65 X 42 mm och väger i genomsnitt 63,3 g. Ruvningstiden är 28 dagar.

Parningssäsong:

Äggläggningen sker från maj till juni, även om vissa fåglar inte lägger ägg för än vid julis början vid högre höjder.

Kullstorlek per säsong

2 till 3 ägg

Genomsnittlig tid för kläckning

28 dagar

Snittålder vid sexuell eller reproduktiv mognad (Höna) 2 år

Snittålder vid sexuell eller reproduktiv mognad (Tupp) 2 år

De nykläckta kycklingarna är bruna i olika toner. De kan överleva utan mat i 2 dagar efter kläckning. Efter två till tre dagar kan kycklingarna flyga och övernatta i vegetationen. Kycklingarna förblir hos hönan under sitt första levnadsår.

Dessa fåglar är mer beroende av att flyga än andra tragopaner. De tillbringar också mycket tid uppe i träden. Satyrtragopanert vandrar uppåt och nedåt på Himalayas sluttning, allt efter årstidens växlingar.

Vintertid är de på 1000m till 2000m lägre höjd än de normalt är under häckningssäsongen.

Satyrtragopaner är skygga fåglar, de är ofta dolda och svåra att se i sin naturliga livsmiljö. Även när de blir skrämnda kommer fåglarna snabbt att flyga in i närliggande grenar och gömmer sig. Under sommaren lever de parvis. Under efterårssäsongen kan de hittas i små grupper. Vid andra tider på året kan de vara ensamma.

Tuppens läte är ett ropande "wah waah oo-ah oo-aaaaa," som blir allt högre allt efter som ropet fortskrider. Ropen upprepas 12 till 14 gånger. Lock och revirropen sker vanligtvis under soluppgången och kan vara under cirka 30 minuter. Under vår eller höst kan ett "wah wah" läte höras från både hönor och tuppar, kan fungera som ett lockrop under parningssäsongen. Ett varningsläte "wak wak" läte skriks ut av både hönor och tuppar när de skräms upp från sina sittplatser.

Föda:

Tragopaner äter insekter, mycket grön vegetation, rötter, frön, nötter, bär och annan frukt : Satyr tragopaner tycker särskilt om kronblad, knoppar och löv av växter som Laurelkörsbär, Rhododendron, ormbunkar Tibast, och Kassiakanel. De äter också bambuskott, rhododendronfrön och lökar från lökväxter. Insekterna som de äter inkluderar tvestjärtar, myror och kackerlackor. De äter också ryggradslösa djur som spindlar och tusefotingar. I fångenskap äter dessa tragopaner nästan uteslutande frukter och bär, om de får välja själv.

När de är i ett födosöksområde, kommer satyrtragopaner att göra sina födosök under tidig morgon och sen eftermiddag. På mulna dagar kan de äta oftare. De finns i skogens utkanter eller djupt i undervegetationen. De håller till på några begränsade områden istället för att röra sig över större områden. Även snöfall kan begränsa satyrtragopanens födosöksområden.

Satyrtragopan


Satyrtragopanen (*Meleagris satyra*) finns i de centrala och östra delarna av Himalaya. Himalaya i Indien från Uttarakhand öster genom Nepal, Sikkim och Bhutan till Assam och i väster Arunachal Pradesh, sydöst i Tibet (Chumbi dalen Öster till Lo La) För det mesta är de den enda tragopan i Bhutan och Nepal.

Satyrtragopaner är ganska hårdföra och lever i bergsområden från cirka 2400 till 3700 m.ö.h och ibland ända upp till 4300 m.ö.h. De finns även på lägre höjder i den västra delen av deras utbredningsområde.

Satyrtragopaner finns i kyliga, fuktiga områden eller i torra tempererade barrskogar. De finns även i fuktiga ekskogar med en undervegetation bestående av bambu och rhododendron eller i blandade barrträdskogar och lövskogar. De finns också i klippiga områden eller raviner med små flödande vattenströmmar med örtrik undervegetation där de kan hålla sig dolda.

Satyrtragopan hotbild i naturen.

Trots att Satyrtragopanen är den minst hotade av tragopanerna, anses den här arten ha en liten till måttligt liten population, som är utsatt för jakt över det mesta av sitt utbredningsområde och även av att de drabbas negativt av skogsavverkning. *Utbredningsområde i Himalaja*





THE SATYR TRAGOPAN.



Satyrtupp

Vid fyra månaders ålder har unga tuppar en svart teckning på sina stjärtfjädrar och sporadiskt placerade apelsinröda fjädrar på halsen. Vanligen kommer ungtuppar inte att få fullt utväxt fjäderdräkt förr en deras andra levnadsår och kommer inte att vara köns mogna innan den här tiden.

Tuppen är ca 71 cm lång och hönan är ca 61 cm långa. För tuppen är vinglängden mellan 245 och 285 mm och stjärtlängden varierar mellan 250 och 345 mm. Hönans vinglängd och stjärtlängd är mellan 215 till 245 mm respektive 195 mm.

Fortplantning:

Tuppar kommer att anta två distinkta speluppvisningar under parningstiden. Sidouppvisningen är sådan att tuppen visar upp ena sidan av sig själv mot hönan med vingen närmast henne sänkt och den andra vingen höjd. Han sträcker ut sig från sidan, platt så att han ser ut som om han hade pressats mot en vägg.

Hans-Olof Axgren

Predatorer: Människor, stora katter som leoparder, mårdar och rävar anses vara de djur som **gärna äter fasaner**.

Engelska namn:

Crimson horned tragopan, Crimson-horned fasan, Indian tragopan.

Franska namn: tragopan satyre

Tyska: satyrtragopan Spanska:

tragopán sátiro taxonomi: *Meleagris*

satyra Linné 1758, Andra

kommentarer:

En genetisk studie indikerade att nuvarande art är närmast släkt till Gråbukig tragopan (*T. blythii*). Satyrtragopanen har hybridiserats i fångenskap med Swinhoes fasan (*Lophura swinhoii*).

